

殺菌剤
フラメトピル粒剤

リンバー[®]粒剤

農林水産省登録 第19366号
(住友化学(株)登録)

性状：淡灰色細粒
毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称）
危険物：非該当
有効年限：5年
包装：3kg×8

有効成分：フラメトピル（化管法第1種）・・・・・・1.5%

殺菌剤分類 7

リンバー[®]は住友化学(株)の登録商標です。

特長

- 優れた抗菌活性。
 - ・紋枯病菌に対し強力な抗菌活性を有するため、高い防除効果を発揮します。
- 優れた作用特性。
 - ・菌核形成と菌核からの発芽、および菌糸の生育を抑制し、特に侵入菌糸塊の形成を抑えるため、稲への感染を強力に阻害します。
- 優れた実用場面での特性。
 - ・予防・治療（病斑進展阻止）効果に加え、稲体への吸収移行に優れており、散布剤に劣らない速効的な防除効果が期待できます。
- 広い散布適期幅。
 - ・残効性に優れており、出穂期からその一ヶ月前またはそれ以前の散布でも有効な防除効果が期待できます。
- 省力的な防除が可能。
 - ・薬剤の飛散が少なく、防除作業が容易な水面施用粒剤です。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フラメトピルを 含む農薬の 総使用回数
稲	紋枯病 疑似紋枯症 (褐色菌核病菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌)	3～4kg	収穫30日前 まで	2回以内	散布	2回以内 (直播では種時 又は移植時までの 処理は1回以内)

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 散布に当っては湛水状態（水深3cm以上）で播きむらのないように均一に散布し、散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 漏水のはげしい水田では効果の劣る場合があるので使用をさけてください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。（刺激性）
- 眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。（刺激性）
- 散布の際は手袋・長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので養魚田では使用しないでください。
- 散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。

保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。