

殺虫剤 クロチアニジン粒剤 ネキリスター [®]	農林水産省登録 第24452号 性状：黄赤色細粒 毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：非該当 有効年限：4年 包装：2kg×8
---	---

有効成分：クロチアニジン・・・0.25%

殺虫剤分類

4 A

ネキリスター[®]はサンケイ化学（株）の登録商標です。

特長

- 土壌潜伏性のネキリムシ類、地上徘徊性のコオロギ類・ダンゴムシを誘引し、害虫が摂食することで効果を発揮するベイト剤（毒餌）です。
- 有効成分が根から吸収移行することにより、作物に寄生するアブラムシ類に対しても効果を示します（発生初期の密度抑制）。
- 小粒のため、害虫との遭遇率が上がり、効果が安定します。
- 水を使わず株元に散布するだけなので、省力的かつ簡単に処理できます。
- 燈色なので散布したところの分かりやすい製剤です。
- 人畜に対して安全性の高い普通物です。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む 農薬の総使用回数
はくさい レタス	アブラムシ類	3～6kg	収穫30日前 まで	2回以内	株元散布	5回以内 〔定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は2回以内、 定植後の株元散布は2回以内〕
	コオロギ類 ネキリムシ類 ダンゴムシ	3kg				
非結球レタス	アブラムシ類	3～6kg	収穫前日 まで	2回以内	株元散布	5回以内 〔定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は2回以内、 定植後の株元散布は2回以内〕
	コオロギ類 ネキリムシ類 ダンゴムシ	3kg				

使用上の注意事項

- 作物にかからないよう株元の土壌表面に散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく冷涼で子供の手が届かない場所に密封して保管してください。