

殺虫殺菌剤
なたね油乳剤

なのはな乳剤

農林水産省登録 第25022号
性状：淡黄色澄明可乳化油状液体
毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）
危険物：第四類第四石油類
有効年限：4年
包装：1ℓ×12

有効成分：なたね油・・・90.0%

殺虫剤分類	—
殺菌剤分類	NC

特長

- 有効成分はなたね油で、ハダニ類やコナジラミ類、うどんこ病に効果を示します。特にうどんこ病に対し高い効果を示します。
- ハダニ類の全ステージ（卵、幼若虫、成虫）、コナジラミ類の全ステージ（卵、幼虫、成虫）に有効です。
- 薬剤に対する感受性が低下したハダニ類、コナジラミ類、うどんこ病にも有効です。
- 安全性が高く、収穫前日まで使用できます。有機栽培に使用可能です。
- ミツバチ、天敵に対する影響の少ないことが確認されています。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	なたね油を 含む農薬の 総使用回数
野菜類 (きゅうり、 かぼちゃ、 ズッキーニ を除く)	ハダニ類 コナジラミ類	300～ 500倍	150～ 500ℓ	収穫前日 まで	—	散布	—
きゅうり かぼちゃ ズッキーニ	うどんこ病	200倍	150～ 500ℓ	収穫前日 まで	—	散布	—
	ハダニ類 コナジラミ類	200～ 500倍					
花き類・ 観葉植物 (きく、ばら を除く)	ハダニ類 コナジラミ類	300～ 500倍	150～ 500ℓ	発生初期	—	散布	—
きく	ハダニ類	300～ 500倍	150～ 500ℓ	発生初期	—	散布	—
ばら	うどんこ病	200倍	150～ 500ℓ	発病前～ 発病初期	—	散布	—
	ハダニ類 コナジラミ類	200～ 500倍		発生初期			
茶	カンザワハダニ	200～ 500倍	150～ 500ℓ	摘採前日 まで	—	散布	—

使用上の注意事項

- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- ジチアノン水和剤、キャプタン水和剤およびストロビルリン系薬剤との同時施用及び近接散布は、薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用はさけてください。
- 散布直後の降雨は、本剤の効果を低下させるので、好天の続く時に使用してください。
- うどんこ病の防除に使用する場合、発病後の散布は効果が劣るので本病の発生前、発生初期から予防的に散布してください。
- 害虫の防除に使用する場合、散布液が直接害虫にかかるよう葉の表裏に丁寧に散布してください。また、多発生時には効果を高めるために数日間隔で連続散布することをおすすめします。
- 幼苗期の散布及び過度の連用は薬害を生じるおそれがあるのでさけてください。
- 花き類・観葉植物に使用の場合は、品種、栽培条件等により花卉、苞、葉に薬害を生じる場合があるので、事前に安全を確認して使用してください。特に結蕾期以降の散布は注意してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用の場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

保管に関する注意事項

- 火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管してください。