除草剤
グルホシネート液剤

TAJ（タージ）

農林水産省登録　第25016号
（日本アグロサービス(株)登録）
性状：青緑色澄明水溶性液体
毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称）
危険物：指定可燃物　可燃性液体類
有効年限：4年
規格：500㎖×20、1ℓ×10、5ℓ×4、20ℓ

有効成分：グルホシネート・・・・・18.5%

除草剤分類　10

TAJ(タージ)はインドのシャルダ･クロップケム(Sharda Cropchem Limited.)の製品です。

特長

○グルホシネートの新規除草剤です。
○食用作物の農薬登録も取得しています。
○効果の発現が比較的速く、殺草スペクトラムが広いです。
○難防除雑草のスギナ、ツユクサ、オヒシバ、オオアレチノギクなどに高い効果を発揮します。
○水田畦畔やのり面が崩れにくいです。
○果樹園で使用する場合に、果樹への影響が少ない薬剤です。
○人と環境に対する安全性の高い薬剤です。

適用雑草名及び使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量（/10a）	希釈水量（/10a）	本剤の使用回数	使用方法	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ及びｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄPを含む農薬の総使用回数
小麦	ー	一年生雑草	は種前（雑草生育期）	300～750㎖	100～150ℓ	1回	雑草茎葉散布	4回以内（は種後は3回以内）
			は種後出芽前（雑草生育期）	300～500㎖				
	圃場内の周縁部		収穫7日前まで（雑草生育期）			3回以内		
かんきつ りんご	ー	一年生雑草	収穫21日前まで（雑草生育期）	300～500㎖	100～150ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000㎖				
ぶどう なし かき もも	ー	一年生雑草	収穫前日まで（雑草生育期）	300～500㎖	100～150ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		500～1000㎖				
キャベツ はくさい	ー	一年生雑草	収穫45日前まで（雑草生育期定植前又は畦間処理）	300～500㎖	100～150ℓ	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
きゅうり なす ピーマン トマト ミニトマト	ー	一年生雑草	収穫前日まで（雑草生育期定植前又は畦間処理）	300～500㎖	100～150ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
ねぎ たまねぎ ブロッコリー	ー	一年生雑草	収穫前日まで（雑草生育期定植前又は畦間処理）	300～500㎖	100～150ℓ	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
だいこん	ー	一年生雑草	収穫45日前まで（雑草生育期は種前又は畦間処理）	300～500㎖	100～150ℓ	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
ほうれんそう	ー	一年生雑草	収穫7日前まで(雑草生育期は種前又は畦間処理）	300～500㎖	100～150ℓ	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
レタス	ー	一年生雑草	収穫30日前まで（雑草生育期定植前又は畦間処理）	300～500㎖	100～150ℓ	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量 (/10a)	希釈水量 (/10a)	本剤の 使用回数	使用方法	ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄ及び ｸﾞﾙﾎｼﾈｰﾄPを 含む農薬の 総使用回数
かんしょ	ー	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期挿苗 前又は畦間処理)	200～ 500mℓ	100～150ℓ	2回以内	雑草茎葉散布	2回以内
ばれいしょ	ー	一年生雑草	雑草生育期植付前 又は植付後萌芽直 前	100～ 200mℓ	100～150ℓ	1回	雑草茎葉散布	3回以内 (萌芽前は1回以内、 萌芽後は2回以内)
			収穫21日前まで (畦間処理: 雑草生育期)	300～ 500mℓ		2回以内		
えだまめ	ー	一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	300～ 500mℓ	100～150ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
			は種後出芽前 (雑草生育期)					
			定植5日前まで(雑 草生育期)					
			収穫14日前まで (畦間処理: 雑草生育期)					
さやいんげん さやえんどう	ー	一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	300～ 500mℓ	100～150ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
			定植前 (雑草生育期)					
			収穫前日まで (畦間処理: 雑草生育期)					
水稲(水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 多年生広葉雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	500～ 1000mℓ	100～150ℓ	2回以内	雑草茎葉散布	3回以内
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生及び 多年生雑草	雑草生育期	500～ 1000mℓ	100～150ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	300～ 500mℓ	100～150ℓ	1回	雑草茎葉散布	1回
花き類･観葉植物	ー	一年生雑草	雑草生育期 畦間処理	300～ 500mℓ	100～150ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
樹木類	ー	一年生雑草	雑草生育期	300～ 500mℓ	100～150ℓ	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
樹木等	公園、庭園、 堤とう、駐車場、 道路、運動場、 宅地、のり面、 鉄道等			500～ 1000mℓ	100～200ℓ		植栽地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布	
		多年生雑草		1000～ 2000mℓ				

使用上の注意事項

●泥などで濁った水は効果を低下させるので本剤の調製には用いないでください。
●使用量に合わせ薬液を調製して使いきってください。
●展着剤の加用の必要はありません。
●本剤は通常2～5日で効果が発現し、効果完成まで1～2週間ほど要するので、誤って再散布や刈払い、耕起をしないでください。
●本剤は土壌に落下すると速やかに不活性化して、効果が発現しないため、薬液が雑草の茎葉全体に均一にかかるように散布してください。また、本剤は雑草生育期(草丈30cm以下)に有効なので、時期を失しないように散布してください。
●散布後6時間以内の降雨は効果が低下することがあるため、天候に注意して散布してください。
●農作物や有用植物に薬液が付着すると薬害を生じるため、かからないように十分注意してください。特に野菜類や花き類の生育期畦間散布で使用する場合には、作物にかからないように十分注意して散布してください。
●水源池などに本剤が飛散、流入しないように十分に注意してください。
●散布器具、容器などの洗浄水は河川などに流さず、空容器などは放置せず、環境に影響を与えないように適切に処理してください。
●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
●本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
●公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
●使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

水産動植物に係る注意事項

●水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、養魚田周辺での使用には注意してください。

保管に関する注意事項

●直射日光をさけ、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。