殺菌剤
イミノクタジン酢酸塩・銅水和剤

ベフドー®水和剤

農林水産省登録　第１６１０４号
性状：淡緑色水和性粉末　４５μm以下
毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称）
危険物：非該当
有効期限：４年
包装：５００ｇ×２０，１kg×２０

有効成分：イミノクタジン酢酸塩（化管法第１種）・・・・・２.５％
塩基性塩化銅・・・・・・・・・・・・・・・・・７３.５％
（銅として４４.０％）

殺菌剤分類　Ｍ７，Ｍ１

ベフドー®はサンケイ化学（株）の登録商標です。

特長

〇幅広い抗菌スペクトラムを持つイミノクタジン酢酸塩と保護効果に優れる塩基性塩化銅の混合剤で、広範囲の病害に高い予防効果があります。
〇うどんこ病、灰色かび病、炭疽病、新梢枯死症などの病害に優れた防除効果があります。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	１０アール当り使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数
茶	炭疽病 赤焼病 もち病 網もち病	５００～７００倍	２００～４００ℓ	摘採７日前まで	２回以内	散布	２回以内	ー
	新梢枯死症 （輪斑病菌による） 褐色円星病 灰色かび病 黒葉腐病	５００倍						
きゅうり	灰色かび病 炭疽病 斑点細菌病 べと病 うどんこ病 黒星病 褐斑病	５００倍	１００～３００ℓ	収穫前日まで	７回以内	散布	７回以内	ー
	菌核病	１０００倍						
かぼちゃ	うどんこ病 白斑病 疫病	５００倍	１００～３００ℓ	収穫７日前まで	４回以内	散布	４回以内	ー
キャベツ	黒腐病 べと病	５００倍	１００～３００ℓ	収穫１４日前まで	３回以内	散布	３回以内	ー

使用上の注意事項

●本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
●石灰硫黄合剤、マシン油乳剤などとの混用はさけてください。
●きゅうりに使用する場合には次の事項に注意してください。
〇薬害を生じやすいので幼苗期散布はさけて中期以降に散布してください。
尚、高温時の散布は症状が激しくなることがあるのでさけてください。
〇連続散布は葉の周辺が黄化したり、硬化することがあるので過度の連用はさけてください。
●キャベツに使用する場合には次の事項に注意してください。
〇結球開始期以降の散布で薬害を生じることがあるので注意してください。
〇炭酸カルシウム剤の所定量の添加は、薬害軽減に有効です。
●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。

安全使用上の注意事項

●取扱いには十分注意してください。
　誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
　本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
●粉末は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。 眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
●散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。また、散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

水産動植物に係る注意事項

●本剤は水産動植物（甲殻類、藻類）に影響を及ぼすおそれがあるので河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
●使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管に関する注意事項

●直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。