

殺虫剤
ベルメトリン乳剤

農林水産省登録 第15960号
性状：淡黄色澄明可溶化油状液体
毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指すという通称）
危険物：第四類第二石油類
有効年限：5年
包装：100ml×60, 500ml×20

有効成分：ベルメトリン（化管法第1種）・・・・・・20.0%

殺虫剤分類 3A

アディオンは住友化学（株）の登録商標です。

特長
○幅広い適用作物 野菜、果樹、茶など70作物以上に登録を有しています。
○ワイドな殺虫スペクトラム 野菜のチョウ目、アブラムシ類、果樹のシンクイムシ類、アブラムシ類などを防除できます。
○速攻性と残効性を発揮 接触作用により高い殺虫効果と優れた速効性を発揮します。また、残効性にも優れるので、発生期間の長い害虫の防除にも効果的です。
○普通物で収穫前日登録 トマト、ミニトマト、きゅうり、なす、ピーマン、いちご、えだまめ、オクラ、こまつななどに収穫前日登録があります。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベルメトリンを含む農薬の総使用回数
なし	アブラムシ類 シンクイムシ類	2000～3000倍	200～700ℓ／10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	ハマキムシ類 カメムシ類	2000倍					
もも	カメムシ類	2000倍	200～700ℓ／10a	収穫7日前まで	6回以内	散布	6回以内
	シンクイムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類	2000～3000倍					
	モモハモグリガ	2000～4000倍					
ネクタリン	カメムシ類	2000倍	200～700ℓ／10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	シンクイムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類	2000～3000倍					
	モモハモグリガ	2000～4000倍					
うめ	アブラムシ類	3000倍	200～700ℓ／10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
かき	カキノヘタムシガ チャノキイロアザミウマ カメムシ類	2000～3000倍	200～700ℓ／10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
	カキクダアザミウマ	2000倍					
キウイフルーツ	キイロマイコガ	2000～3000倍	200～700ℓ／10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
	カメムシ類	2000倍					
くり	クリタマバチ	1000～2000倍	200～700ℓ／10a	羽化脱出期 但し 収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内
	クリシギゾウムシ	2000倍		収穫14日前まで			
かんきつ	ミカンハモグリガ アブラムシ類	2000～4000倍	200～700ℓ／10a	収穫14日前まで	6回以内	散布	6回以内
	チャノキイロアザミウマ	2000～3000倍					
	カメムシ類	2000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペルメトリンを含む農薬の総使用回数
いちじく	アザミウマ類 アブラムシ類	2 0 0 0倍	2 0 0 ～ 7 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	2 回以内
	イチジクヒトリモドキ	3 0 0 0倍					
はまなす (果実)	シンクイムシ類	2 0 0 0倍	2 0 0 ～ 7 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
さるなし	キイロマイコガ	2 0 0 0倍	2 0 0 ～ 7 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
アロニア	シンクイムシ類	3 0 0 0倍	2 0 0 ～ 7 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 1 4 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
ハスカップ	ハマキムシ類 アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0倍	2 0 0 ～ 7 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 3 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
とうもろこし	アワノメイガ	2 0 0 0倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 1 4 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内
	アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0倍					
きゅうり	オンシツコナジラミ アブラムシ類 ウリハムシ	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
ズッキーニ	アブラムシ類 フキノメイガ	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	6 回以内 (乳剤は 3 回以内、 粒剤は 3 回以内)
にがうり	アブラムシ類 カメムシ類 タバコカスミカメ ヨトウムシ類 フキノメイガ	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
すいか メロン かぼちゃ	アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	5 回以内	散布	5 回以内
いちご	アブラムシ類	3 0 0 0倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	5 回以内	散布	5 回以内
ごぼう	アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
	ヨトウムシ	2 0 0 0倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
葉ごぼう	アブラムシ類	3 0 0 0倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 1 4 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
非結球あぶらな科葉 菜類(こまつな、 非結球はくさい、 みずな、なばな類を 除く)	アオムシ	2 0 0 0倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ	2 0 0 0倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 3 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内 (株元灌注は 2 回以内)
	ネキリムシ類	4 0 0 0 ～ 8 0 0 0倍	0.5 ℓ ／ m ²	収穫 2 1 日前 まで	2 回以内	株元灌注	
	アオムシ ヨトウムシ	3 2 倍	1.6 ～ 3.2 ℓ ／ 1 0 a	収穫 3 日前 まで	5 回以内	無人航空機 による散布	

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベルメトリンを含む農薬の総使用回数
はくさい	アブラムシ類 アオムシ コナガ ハクサイダニ ヨトウムシ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
	ネキリムシ類	4 0 0 0 ～ 8 0 0 0 倍	0.5 ～ 1 ℓ ／ m ²			株元灌注	
	アオムシ ヨトウムシ	3 2 倍	1.6 ～ 3.2 ℓ ／ 1 0 a			無人航空機 による散布	
		6 4 倍	3.2 ℓ ／ 1 0 a				
だいこん	アオムシ コナガ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ ダイコンハムシ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 3 0 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内
	アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍					
かぶ	アオムシ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	4 回以内 (散布は 2 回以内)
茎ブロッコリー	アオムシ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
ブロッコリー	コナガ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 3 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
	アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍					
	ネキリムシ類	4 0 0 0 ～ 8 0 0 0 倍	0.5 ～ 1 ℓ／m ²	収穫 7 日前 まで		株元灌注	
カリフラワー	コナガ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 3 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
	アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍					
なばな類	アオムシ コナガ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
こまつな	アオムシ ハクサイダニ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
非結球はくさい	アオムシ	2 0 0 0 ～ 4 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
みずな	アブラムシ類 ダイコンハムシ ヤサイゾウムシ	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	アオムシ	2 0 0 0 倍					
レタス	アブラムシ類 ヨトウムシ	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 3 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
非結球レタス	アブラムシ類 ヨトウムシ	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	4 回以内 (乳剤は 2 回以内、 粒剤は 2 回以内)
トレビス	アブラムシ類	3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベルメトリンを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	アザミウマ類 ネギコガ ハスモンヨトウ	3 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫7日前 まで	5回以内	散布	5回以内
ねぎ	アザミウマ類 ネギコガ	2 0 0 0～ 3 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	シロイチモジヨトウ	2 0 0 0倍					
	ネキリムシ類	4 0 0 0～ 8 0 0 0倍	0.5 ℓ～1 ℓ／㎡	収穫7日前 まで		株元灌注	
にんにく	アブラムシ類 ネギコガ	2 0 0 0～ 3 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫前日 まで	2回以内	散布	4回以内 (乳剤は2回以内、 粒剤は2回以内)
	アブラシム類	3 2～ 4 8倍	1.6 ℓ／1 0 a			無人航空機 による散布	
アスパラガス	ジュウシホシクビナガハムシ カメムシ類	2 0 0 0～ 3 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
	ヨトウムシ アブラムシ類	2 0 0 0倍					
豆類(未成熟、ただし、 えだまめ、さやいん げん、さやえんどう、 未成熟そらまめを除 く)	アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類 ウラナミシジミ アズキノメイガ マメシンクイガ	3 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
えだまめ	アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類 ウラナミシジミ アズキノメイガ マメシンクイガ ウコンノメイガ ツメクサガ フタスジヒメハムシ マメハンミョウ	3 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
未成熟そらまめ	アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類 ウラナミシジミ アズキノメイガ マメシンクイガ	3 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
さやいんげん	カメムシ類 アザミウマ類 アブラムシ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類 ウラナミシジミ アズキノメイガ マメシンクイガ	3 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
さやえんどう	ナモグリバエ ヨトウムシ類 ウラナミシジミ	3 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
ほうれんそう	アブラムシ類 ハクサイダニ	3 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内
はこべ	オオタバコガ	3 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫21日前 まで	1回	散布	1回

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベルメトリンを含む農薬の総使用回数
だいず	アブラムシ類 カメムシ類 ウコンノメイガ ツメクサガ フタスジヒメハムシ マメシンクイガ マメハンミョウ	3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
		2 4 倍	0.8 ℓ ／ 1 0 a			無人航空機 による散布	
あずき	アズキノメイガ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍					
そらまめ	アブラムシ類	3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
しそ	ハスモンヨトウ ウリハムシモドキ アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類	4 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	2 回以内	散布	4 回以内 (乳剤は 2 回以内、 粒剤は 2 回以内)
トマト	オンシツコナジラミ アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
ミニトマト	オンシツコナジラミ アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	4 回以内 (株元散布は 1 回以内、 散布及び噴射は合計 3 回以内)
なす	アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	オンシツコナジラミ テントウムシダマシ類 カメムシ類	2 0 0 0 倍					
ピーマン	アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	5 回以内	散布	5 回以内
	タバコガ カメムシ類	2 0 0 0 倍					
とうがらし類	アブラムシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
	タバコガ	2 0 0 0 倍					
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシダマシ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 1 4 日前 まで	4 回以内	散布	4 回以内
やまのいも	アブラムシ類 ヤマノイモコガ アザミウマ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
さといも	ハスモンヨトウ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
	アブラムシ類 スズメガ類	2 0 0 0 ～ 3 0 0 0 倍					
さといも (葉柄)	ハスモンヨトウ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
	アブラムシ類	3 0 0 0 倍					
かんしょ	イモコガ	3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内
オクラ	ハスモンヨトウ アブラムシ類 カメムシ類	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
つるむらさき	ヨトウムシ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 7 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
食用ゆり	アブラムシ類	3 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫前日 まで	5 回以内	散布	5 回以内
食用亜麻	ヨトウガ	2 0 0 0 倍	1 0 0 ～ 3 0 0 ℓ ／ 1 0 a	収穫 1 4 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベルメトリンを含む農薬の総使用回数
ごま	アブラムシ類 カメムシ類	2 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
しゅんぎく	アブラムシ類 ハクサイダニ	4 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	収穫 2 1 日前 まで	2 回以内	散布	2 回以内
茶	チャノコカクモンハマキ	2 0 0 0倍	2 0 0～4 0 0 ℓ ／1 0 a	摘採 1 4 日前 まで	1 回	散布	1 回
	チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノキイロアザミウマ	2 0 0 0～ 3 0 0 0倍					
花き類・観葉植物(は ばたんを除く)	アブラムシ類	2 0 0 0～ 4 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	発生初期	6 回以内	散布	6 回以内
	カメムシ類 ハマキムシ類 ヨトウムシ類	2 0 0 0倍					
はばたん	アブラムシ類	2 0 0 0～ 4 0 0 0倍	1 0 0～3 0 0 ℓ ／1 0 a	発生初期	6 回以内	散布	6 回以内
	カメムシ類 ハマキムシ類 ヨトウムシ類 アオムシ	2 0 0 0倍					
樹木類 (くちなしを除く)	ケムシ類 アブラムシ類 シャクトリムシ類	4 0 0 0～ 8 0 0 0倍	2 0 0～7 0 0 ℓ ／1 0 a	発生初期	6 回以内	散布	6 回以内
くちなし	ケムシ類 アブラムシ類 シャクトリムシ類	4 0 0 0～ 8 0 0 0倍	2 0 0～7 0 0 ℓ ／1 0 a	発生初期	6 回以内	散布	6 回以内
	アザミウマ類	2 0 0 0倍					

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 本剤のかんきつ、茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意してください。
- みずかけな（水掛菜）、カラー及び花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用后 1 4 日間は入水しないでください。
- ねぎのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若令幼虫期に散布してください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
 - 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - 散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - 散布中薬液の漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - 特定の農薬（混用可能が確認されているもの）を除いて原則として他の農薬との混用は行わないでください。
 - 作業終了後は次の項目を守ってください。
 - ・使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
 - ・使用残りの薬液は必ず安全な場所に責任者をきめて保管してください。
 - ・機体散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合は吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤による中毒の治療法としては、動物実験でメトカルバモール製剤の投与が有効であると報告されています。
- 原液は眼に対して刺激性があるので、薬液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 原液は皮ふに対して刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は農薬用マスク、手袋などを着用してください。また薬液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも使用当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないように注意を払ってください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管に関する注意事項

- 危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意してください。
- 火気をさけ、直射日光の当たらない低温な場所に密栓して保管してください。