殺虫剤

ＢＴ水和剤

サンケイ サブリナ®フロアブル

農林水産省登録　第２１６９５号

性状：褐色水和性粘稠懸濁液体
毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称）
危険物：第四類第三石油類
有効年限：３年
包装：５００ｍℓ× １０

有効成分：バチルスチューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素・・・・・１０.０％

殺虫剤分類	１１Ａ

サブリナ®は三井化学クロップ＆ライフソリューション（株）の登録商標です。

特長

○コナガ、ハスモンヨトウ、チャノコカクモンハマキ等多くのチョウ目害虫に高い効果を示します。
○卵期に処理することで孵化直後のコナガに対して効果を示します。
○拡展性の高い製剤なので展着剤加用の必要がなく、また、作物に対して汚れの少ない製剤です。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ＢＴを含む農薬の総使用回数
野菜類（はくさい､えごま（葉）を除く）	コナガ	１０００～１５００倍	１００～３００ℓ	発生初期収穫前日まで	－	散布	－
	アオムシ ヨトウムシ	１０００倍					
	ハスモンヨトウ	５００～７５０倍					
	オオタバコガ	５００倍					
はくさい	コナガ	１０００～１５００倍	１００～３００ℓ	発生初期収穫前日まで	－	散布	－
	アオムシ ヨトウムシ	１０００倍					
えごま（葉）	コナガ	１０００～１５００倍	１００～３００ℓ	発生初期収穫前日まで	－	散布	－
	アオムシ ヨトウムシ ベニフキノメイガ	１０００倍					
	ハスモンヨトウ	５００～７５０倍					
	オオタバコガ	５００倍					
えごま（種子）	ベニフキノメイガ	１０００倍	１００～３００ℓ	発生初期収穫前日まで	－	散布	－
からしな（種子）	アオムシ コナガ ヨトウムシ	１０００倍	１００～３００ℓ	発生初期収穫前日まで	－	散布	－
	ハスモンヨトウ	５００～７５０倍					
豆類（種実）	ヨトウムシ	１０００倍	１００～３００ℓ	発生初期収穫前日まで	－	散布	－
	ハスモンヨトウ	５００～７５０倍					
	オオタバコガ	５００倍					
いも類	ヨトウムシ	１０００倍	１００～３００ℓ	発生初期収穫前日まで	－	散布	－
	ハスモンヨトウ	５００～７５０倍					
	オオタバコガ	５００倍					
雑穀類（ひえを除く）	アワノメイガ	１０００倍	１００～３００ℓ	発生初期収穫前日まで	－	散布	－

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ＢＴを 含む農薬の 総使用回数
ひえ	アワノメイガ イネヨトウ	１０００倍	１００～ ３００ℓ	発生初期 収穫前日まで	―	散布	―
飼料用とうもろこし	アワノメイガ	１０００倍	１００～ ３００ℓ	発生初期 収穫前日まで	―	散布	―
食用ほおのき（葉）	マイマイガ	１０００倍	２００～ ７００ℓ	発生初期 収穫前日まで	―	散布	―
食用さくら（葉）	ケムシ類	１０００倍	２００～ ７００ℓ	発生初期 収穫前日まで	―	散布	―
食用さくら（花）	ケムシ類	１０００倍	２００～ ７００ℓ	発生初期 収穫前日まで	―	散布	―
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ	１０００倍	２００～ ４００ℓ	発生初期 摘採７日前まで	―	散布	―
樹木類	ケムシ類	１０００倍	２００～ ７００ℓ	発生初期	―	散布	―

使用上の注意事項

●使用前によく振ってから使用してください。
●使用量に合わせて薬液を調製し、使いきってください。
●はくさいに対しては薬害を生じるおそれがあるので、所定の希釈倍数を厳守してください。
●展着剤を加用すると薬害を生じる場合があるので、展着剤の加用に当たっては事前にその適否を確認してください。
●たかなに使用する場合、高温期には薬害を生じることがあるので注意して使用してください。
●本剤の所定量を所定量の水にうすめ、十分かきまぜて散布液を調製してください。
●石灰硫黄合剤、ボルドー液などの農薬及びアルカリ性の強い葉面散布施用の肥料とは混用しないでください。
●散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
●本剤は若齢幼虫に効果が高いので、若齢幼虫期に時期を失せず散布してください。
●蚕に対する毒性があるので、養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では使用しないでください。また、これら以外の場所でも付近に桑園がある場合、飛散してかからないように、風向きなどに十分注意して散布してください。
なお本剤の使用に当たっては散布地域の使用規制に従ってください。
●コレマンアブラバチの活動に影響を及ぼす可能性があるので注意してください。
●ミツバチに対して影響があるので、以下の点に注意してください。
○ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
○受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設等では使用をさけてください。なお、ミツバチを放飼する場合は散布後、１日以上たってから行ってください。
○関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
●適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
●本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

●散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
●かぶれやすい体質の人は、作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
●夏期高温時の使用をさけてください。
●街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管に関する注意事項

●火気や直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管してください。