

殺虫剤 NAC 粒剤

サンケイデナポン®5%バイト

有効成分：NAC（PRTR・1種）・・・・・・・・・・5.0%

農林水産省登録 第12880号

性状：淡褐色粒状 4～7mm

毒性：普通物

（毒劇物に該当しないものを指している通称）

有効年限：4年

包装：2kg × 8



デナポン®は長瀬産業㈱の登録商標です。

特長

○NACに誘引物質を加えて粒状に製剤した誘引殺虫剤で、ネキリムシ、ハスモンヨトウが防除でき優れた効果を示します。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール当たり 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む 農薬の総使用回数
キャベツ	ハスモンヨトウ ネキリムシ類	3～6kg	収穫 14 日前 まで	3 回以内	株元散布	3 回以内
	コオロギ ダンゴムシ	3～4kg				
はくさい	ハスモンヨトウ ネキリムシ類	3～6kg	収穫 21 日前 まで			
	コオロギ ダンゴムシ	3～4kg				
だいこん	ネキリムシ類	3～6kg	収穫 30 日前まで	4 回以内	4 回以内	
たばこ			移植時	—	株元処理	—

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- たばこの芯葉に付着すると葉害を生ずるのでかからないように注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響あるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。

安全使用上の注意事項

- 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤による中毒の治療法としては硫酸アトロピン製剤の投与が有効です。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が誤食する恐れがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。