

殺虫剤

エトフェンプロックス乳剤

トレボン[®] エアー

農林水産省登録 第 17541 号

(三井化学アグロ(株)登録)

性状：類白色粘稠懸濁液体

毒性：普通物(毒物に該当しないものを指している通称)

有効年限：3年

包装：1ℓ×12、10ℓ×2、20ℓ

有効成分：エトフェンプロックス (PRTR・1種)・・・・・・・・・・10.0%

トレボン[®]は三井化学アグロ(株)の登録商標です。

特長

- トレボンエアーはウンカ類、カメムシ類に優れた防除効果を示す空中散布専用の殺虫剤です。
- ウンカ類、カメムシ類をはじめ稲の主要害虫に速効的な効果を示し、残効性にも優れています。
- カーバメート剤に感受性の低下したウンカ類等、諸害虫に対しても安定して殺虫力を示します。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール当り 散布液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の 総使用回数
稲	コブノメイガ イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	30倍	3ℓ	収穫 14日前 まで	3回以内	空中散布	3回以内
	イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	8倍	0.8ℓ				
小麦	ヒメトビウンカ			1.6ℓ	収穫 7日前 まで	2回以内	無人ヘリコプ ターによる 散布
だいち	ハスモンヨトウ カメムシ類	3.2ℓ	収穫 14日前 まで				
あずき	アズキノメイガ			3.2ℓ	収穫 14日前 まで	3回以内	3回以内
しょうが	アワノメイガ	3.2ℓ	収穫 14日前 まで				
やまいも	ヤマノイモコガ アブラムシ類			3.2ℓ	収穫 14日前 まで	3回以内	3回以内

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布は各散布機種での散布基準に従って実施してください。
- 少量散布(8倍液)の散布には、微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
- 無人ヘリコプターによる散布にあたっては、散布機種に適した散布装置を使用してください。
- 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検をおこなってください。
- 散布液の飛散により動植物および自動車やカラートタンの塗料などへ、影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、薬液の飛散により桑の茎葉を汚染することのないように桑園のある地帯では使用しないでください。なお実施にあたっては、事前に蚕業関係者と安全対策について十分協議してください。
- 散布器具、作業衣などは桑用との必ず区別してください。
- ミツバチに対して毒性が強いので(特に低温時)、事前に養蜂業者などと次の安全対策について十分協議の上実施してください。
- 散布に際してはミツバチ及び巣箱に絶対かからないようにしてください。
- 散布当日および1日後はミツバチを移動させるか巢門を閉じてください。

作業後の注意事項

- 使用後の空の容器は放置せず安全な場所に廃棄してください。
- 機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 誤飲などないように注意してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
- 無人ヘリコプターの操作の際は、手袋、長ズボン、長袖の作業着などを着用してください。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔など石けんでよく洗い、うがい・洗顔してください。
- 密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所に保管してください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物に影響を及ぼすので養魚田での使用はさけてください。散布液が水槽、池、河川などに入らないよう注意してください。甲殻類および冷水魚に特に影響を及ぼしおそれがあるので、湖沼および養殖池等周辺での使用はさけてください。なお、比較的低濃度でも魚が平衡失調を起こすおそれがあるので十分注意してください。