

殺虫剤  
エトフェンプロックス乳剤  
**トレボン<sup>®</sup>エアー**

農林水産省登録 第17541号

(三井化学クロップ&ライフソリューション(株)登録)

性状：類白色粘稠懸濁液体

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称）

危険物：非該当

有効年限：3年

包装：1ℓ × 12, 10ℓ × 2, 20ℓ

有効成分：エトフェンプロックス（化管法第1種） · · · · 10.0%

殺虫剤分類

**3 A**

トレボン<sup>®</sup>は三井化学クロップ&ライフソリューション(株)の登録商標です。

**特長**

○空中散布、無人航空機散布専用の殺虫剤です。水稻のウンカ類、カメムシ類やコブノメイガ、だいすのハスモンヨトウやカメムシ類等に優れた効果を示します。

**適用病害虫名及び使用方法**

作物名	適用病害虫名	希釀倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エトフェン <sup>®</sup> ロックスを 含む農薬の 総使用回数
稻	コブノメイガ イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	30倍	3ℓ	収穫14日前 まで	3回以内	空中散布	3回以内
	イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ						
	コブノメイガ イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ	8倍	0.8ℓ			無人航空機 による散布	
麦類	ヒメトビウンカ	8倍	0.8ℓ	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内
とうもろこし 飼料用 とうもろこし	ツマジロクサヨトウ アワヨトウ	8倍	1.6ℓ	収穫7日前 まで	4回以内	無人航空機 による散布	4回以内
だいす えだまめ	ハスモンヨトウ カメムシ類 マメシンクイガ ツメクサガ	8倍	0.8ℓ	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内
あずき	アズキノメイガ	8倍	1.6ℓ	収穫14日前 まで	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内
しょうが	アワノメイガ	8倍	1.6ℓ	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内
ばれいしょ	アブラムシ類	8倍	1.6ℓ	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の 総使用回数
やまのいも	ヤマノイモコガ アブラムシ類	8倍	3.2ℓ	収穫14日前 まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内
ブロッコリー	アオムシ	8倍	1.6ℓ	収穫前日 まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内
はくさい	アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ	8倍	1.6ℓ	収穫7日前 まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内
レタス	アブラムシ類	8倍	1.6ℓ	収穫14日前 まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内
キャベツ	アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ	8倍	1.6ℓ	収穫3日前 まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内
だいこん	アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ	8倍	1.6ℓ	収穫21日前 まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内
ねぎ	シロイチモジヨトウ	8倍	1.6ℓ	収穫21日前 まで	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内

#### 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 敷布は各散布機種の散布基準に従って実施してください。
- 少量散布の際には、微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
- 無人航空機による散布にあっては、散布機種に適合した散布装置を使用してください。
- 敷布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- 敷布薬液の飛散によって動植物及び自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 蚕に対して長期間強い毒性があるので、薬液の飛散により桑の茎葉を汚染することのないように桑園のある地帯では使用しないでください。  
なお、実施に当っては、事前に蚕業関係者と安全対策について十分協議してください。
- 敷布器具、作業衣などは桑用と必ず区別してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  - ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
  - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
- 機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。  
特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

#### 安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 無人航空機の操作の際は、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがい・洗眼してください。

#### 水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物（甲殻類、冷水魚）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてください。なお、比較的低濃度でも魚が平衡失調を起こすおそれがあるので十分注意してください。
- 空中散布又は無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 敷布後は水管理に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

#### 保管に関する注意事項

- 直射日光を避け、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。