

殺虫剤 エトフェンプロックス油剤 なげこみトレボン®	農林水産省登録 第18793号 (三井化学クロップ & ライフソリューション (株) 登録) 性状：淡黄色澄明油状液体水溶性容器入り1個50ml 毒性：普通物 (毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称) 危険物：第四類第四石油類 有効年限：4年 包装：(50ml水溶性容器×6個入り)×20
---	---

有効成分：エトフェンプロックス (化管法第1種) ……4.0%

殺虫剤分類 **3A**

トレボン®は三井化学クロップ & ライフソリューション (株) の登録商標です。

特長 ○容器のまま水田になげこむことができるので、省力的です。 ○薬剤に直接ふれることがなく、飛散することもないので、安全に処理できます。 ○イネミズゾウムシ、イネドロオウムシ、ウンカ・ヨコバイ類など各種水稲害虫に優れた効果を示します。
--

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール当たり 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを 含む農業の 総使用回数
稲	イネミズゾウムシ イネドロオウムシ	水溶性容器 4～6個 (200～300ml)	5葉期以降 収穫21日前まで	3回以内	水田に水溶性 容器のまま 投げ入れる	3回以内
	ウンカ類 ニカメイチュウ第1世代 ツマグロヨコバイ	水溶性容器 10個 (500ml)				
	イナゴ類 イネクロカメムシ	水溶性容器 6～10個 (300～500ml)				
いぐさ	イグサシンムシガ	水溶性容器 6個 (300ml)	—	3回以内	水田に水溶性 容器のまま 投げ入れる	3回以内

使用上の注意事項

- 必要量を購入し、できるだけ残すことなく使い切ってください。
- 水溶性容器を使用しているのでぬれた手で作業しないでください。
- 容器の破損を防ぐため取扱いは慎重に行ってください。
- 薬効に関する事項
 - 本剤の使用に際しては、所定個数を水溶性容器のまま圃場全体に均等に投げ込んでください。
 - 本剤は湛水状態で、土壌にめり込ませないよう畦畔から軽く投げ入れてください。
 - 本剤処理後、少なくとも3～4日間はそのまま湛水状態を保ち、田面を露出させたり水を切らせたりしないように注意し、また、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- 薬害に関する事項
 - 強風下では、薬液が風下に吹き寄せられ薬害を生じることがあるので、使用をさけてください。
 - 内容液が、稲、いぐさの茎葉に直接付着すると薬害を生じるので、水溶性容器のまま田水面に投げ込んでください。
 - 藻、ウキクサ等が多数浮遊している水田等及び稲、いぐさが活着不良または軟弱徒長の場合には薬害を生じることがあるので、使用をさけてください。
 - 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 本剤は水溶性容器に封入されているため、使用の際は濡れた手で触らないでください。
- 使用の際は手袋などを着用してください。使用後は手足、顔などを石けんでよく洗ってください。
- 水溶性容器が破損した場合は以下の点に注意してください。
 - 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
 - 皮膚に対して刺激性があるので、付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物 (甲殻類、冷水魚) に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてください。散布後は水管理に注意してください。

保管に関する注意事項

- 吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を堅く閉じて保管してください。
- 火気をさけ、直射日光が当たらないなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。