殺虫剤
カルタップ・BPMC粒剤

パダン®バッサ®粒剤

農林水産省登録　第２１８０８号
（住友化学（株）登録）
性状：類白色細粒
毒性：劇物
危険物： 非該当
有効年限：２０２５年１０月
包装：３kg×８（販売終了）

有効成分：カルタップ塩酸塩（化管法第１種）・・ ３.５％
BPMC（化管法第１種）・・・・・・ ４.０％

殺虫剤分類　１４，１Ａ

パダン®は住友化学（株）の登録商標です。
バッサ®はクミアイ化学工業（株）と日本農薬（株）の登録商標です。

特長

○広範囲の害虫に優れた殺虫力を示すパダンと、ツマグロヨコバイ・ウンカ類に高い効果をもつバッサとの混合剤で、稲の主要害虫を同時防除します。

○稲体内への浸透性および残効性があり、ニカメイチュウのふ化幼虫の食入を防止するとともに、齢数の進んだ食入幼虫にも高い効果があります。

○粒剤なのでドリフトが少なく、飛散防止に役立ちます。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	１０アール当り処理量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カルタップを含む農薬の総使用回数	BPMCを含む農薬の総使用回数
稲	ニカメイチュウ ウンカ類 イネドロオイムシ ツマグロヨコバイ イネツトムシ	３～４kg	収穫３０日前まで	５回以内	手、又は散粒機で田面に均一に散粒する。	６回以内 （浸種前は１回以内、浸種後から直播でのは種時又は移植時までの処理は１回以内）	５回以内
	コブノメイガ サンカメイチュウ	４kg					
	イネミズゾウムシ スクミリンゴガイ （食害防止）						

使用上の注意事項

●本剤を使用した場合には、チオシクラム又はベンスルタップを含む剤は使用しないでください。
●使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
●本剤は、田水中で粒形が崩壊しなくても成分は速やかに溶出するので薬効に影響はありません。
●本剤をそのまま手又は散布機でむらなく散布してください。
●散布に当っては、田水深を３cm以上にし、散布後少なくとも４～５日間は湛水状態を保ち、散布後７日間は落水、かけ流しはしないでください。
●漏水のはげしい水田では使用しないでください。
●スクミリンゴガイに対しては、食害防止効果を目的として使用する。 本剤には殺貝効果がないので水田以外の生息地には決して使用しないでください。

安全使用上の注意事項

●蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用をさけてください。
●ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
●医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。 誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
●カルタップによる中毒に対しては動物実験でＬ－システイン製剤の投与が有効であると報告されています。 BPMCによる中毒に対しては動物実験で硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。
●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
●本剤は皮ふに対して弱い刺激性があるので皮ふに付着しないよう注意してください。 付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
●散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗いうがいをしてください。

水産動植物に係る注意事項

●水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。 比較的低濃度でも魚が平衡失調等を起すので、養殖池等周辺での使用はさけてください。
●水産動植物（甲殻類、ドジョウ）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
●散布後は水管理に注意してください。
●散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管に関する注意事項

●直射日光をさけ、鍵のかかるなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。