

殺虫剤  
ピリダリル水和剤

# プレオフロアブル<sup>®</sup>

農林水産省登録 第21333号

(住友化学(株)登録)

性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

毒性：普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称)

危険物：非該当

有効年限：5年

包装：100ml×60,500ml×20,5ℓ×2

有効成分：ピリダリル・・・10.0%

殺虫剤分類

UN

プレオ<sup>®</sup>は住友化学(株)の登録商標です。

## 特長

- 優れた殺虫活性。チョウ目及びアザミウマ目に高い活性があります。
- 優れた耐雨性と残効性があります。
- 天敵・有用昆虫に対する影響が少ないです。
- 総合的病害虫管理(IPM)に適合します。ハナカメムシ類等の天敵を利用した防除体系への取り組みができます。

## 適用病害虫名及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダリルを 含む農薬の 総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ ウワバ類	1000倍	100~ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	アオムシ オオタバコガ コナガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	16倍	1.6~ 3.2ℓ				
		32倍	3.2ℓ				
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ オオタバコガ	1000倍	100~ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
		16倍	1.6~ 3.2ℓ			無人航空機 による散布	
		32倍	3.2ℓ				
だいこん	コナガ アオムシ ヨトウムシ カブラハバチ	1000倍	100~ 300ℓ	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	アオムシ コナガ ヨトウムシ	16倍	1.6~ 3.2ℓ			無人航空機 による散布	
		32倍	3.2ℓ				
かぶ	ハスモンヨトウ	1000倍	100~ 300ℓ	収穫3日前 まで	2回以内	散布	2回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダリルを 含む農薬の 総使用回数
にんじん	ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
ごぼう	ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
レタス	ナモグリバエ ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類 シロイチモジヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
非結球レタス	ナモグリバエ ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
非結球あぶらな科葉菜類 (こまつな、みずな、 なばな類を除く)	コナガ シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
こまつな みずな	コナガ シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
すいぜんじな	ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
しょくようほおずき	アザミウマ類	1000倍	100～ 300ℓ	収穫3日前 まで	2回以内	散布	2回以内
なす	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類 ハモグリバエ類	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内
トマト ミニトマト	ハスモンヨトウ オオタバコガ シロイチモジヨトウ トマトキバガ ハモグリバエ類	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
ピーマン とうがらし類	タバコガ類 アザミウマ類	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
なばな類	コナガ シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫3日前 まで	4回以内	散布	4回以内
たまねぎ	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫3日前 まで	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内
	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	16倍	1.6～ 3.2ℓ				
		32倍	3.2ℓ				
いちご	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダリルを 含む農薬の 総使用回数
カリフラワー	コナガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫3日前 まで	2回以内	散布	2回以内
ブロッコリー	コナガ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内
	コナガ ハスモンヨトウ	16倍	1.6～ 3.2倍				
		32倍	3.2ℓ				
莖ブロッコリー	ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫3日前 まで	2回以内	散布	2回以内
未成熟とうもろこし	オオタバコガ ツマジロクサヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
オクラ	オオタバコガ ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
きゅうり メロン	ハモグリバエ類 アザミウマ類 ウリノメイガ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
とうがん	ミナミキイロアザミウマ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ネギアザミウマ	1000倍	100～ 500ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
にら	ネギアザミウマ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
しゅんぎく	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
しょうが	ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
せり科葉菜類 (セルリーを除く)	ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫3日前まで 但し、みつば の伏せ込み 栽培は伏せ 込み前まで	2回以内	散布	2回以内
セルリー	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
すいか	ハスモンヨトウ オオタバコガ ウリノメイガ アザミウマ類	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
にがうり	ハスモンヨトウ ウリノメイガ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
ほうれんそう	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 シロイチモジヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
さやいんげん	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	1000～ 2000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	ハモグリバエ類 オオタバコガ ヨトウムシ	1000倍					

作物名	適用病虫害名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダリルを 含む農薬の 総使用回数
豆類(未成熟、ただし、さや いんげんを除く)	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	1000～ 2000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	オオタバコガ ハモグリバエ類	1000倍					
豆類(種実、ただし、だい ず、らっかせいを除く)	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	1000～ 2000倍	100～ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	オオタバコガ ハモグリバエ類	1000倍					
だいず	ハスモンヨトウ マメシンクイガ シロイチモジヨトウ	1000～ 2000倍	100～ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	オオタバコガ ハモグリバエ類	1000倍					
	オオタバコガ	8倍	0.8ℓ			無人航空機 による散布	
	ハスモンヨトウ	8～16倍	0.8ℓ				
ばれいしょ	オオタバコガ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	ハスモンヨトウ	1000～ 2000倍					
		16倍	0.8～ 1.6ℓ			無人航空機 による散布	
32倍	1.6～ 3.2ℓ						
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ ヒルガオハモグリガ	1000～ 2000倍	100～ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
		16倍	0.8～ 1.6ℓ				
		32倍	1.6～ 3.2ℓ			無人航空機 による散布	
さといも	ハスモンヨトウ スズメガ類	1000～ 2000倍	100～ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内		散布
		32倍	1.6～ 3.2ℓ				
		64倍	3.2ℓ			無人航空機 による散布	
そば	ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内		散布
	ヨトウムシ	1000～ 2000倍					
しそ しそ(花穂) バジル タラゴン みしまさいこ	ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
みょうが(花穂) みょうが(茎葉) 食用ミニバラ	ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
さんしょう(葉)	アゲハ類	1000倍	100～ 300ℓ	収穫21日前 まで	2回以内	散布	2回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10アール 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリダリルを 含む農薬の 総使用回数
食用ぎく	オオタバコガ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
きく(葉)	オオタバコガ	1000倍	100～ 300ℓ	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内
花き類・観葉植物	オオタバコガ ハスモンヨトウ	1000倍	100～ 300ℓ	発生初期	4回以内	散布	4回以内

#### 使用上の注意事項

- 使用前によく振ってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ってください。
  - 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
  - 無人航空機による散布にあつては散布機種に適合した散布装置を使用してください。
  - 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
  - 特定の農薬（混用可能が確認されているもの）を除いて原則として他の農薬との混用は行わないでください。
  - 散布終了後は次の事項を守ってください。
    - ・使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
    - ・使用残りの薬液は必ず安全な場所に責任者をきめて保管してください。
    - ・機体散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 非結球レタスには品種によっては薬害を生じるおそれがあるのであらかじめ薬害のないことを確かめたうえで使用してください。
- せり、みずかけな（水掛菜）、カラー及び花はすに使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- 本剤の使用に当つては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

#### 安全使用上の注意事項

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないように注意してください。
- 本剤は皮ふに対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

#### 水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

#### 保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管してください。