



殺虫・殺菌剤

SANKEI 水和硫黄剤
ECO PRODUCTS

サンケイ クムラス®

農林水産省登録 第21874号

性状：褐色水和性微粒及び細粒

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

危険物：第二類 硫黄

有効年限：5年

包装：1kg×20、3kg×8

有効成分：硫黄・・・・・・・・・・79.2%

殺虫剤分類 UN 殺菌剤分類 M2

クムラス®はBASF社の登録商標です。

特長

○硫黄を有効成分とし、ハダニ類、サビダニ、うどんこ病やさび病等に効果を示す殺虫殺菌剤です。薬液調製がしやすい顆粒状の製剤です。

適用病害虫名、適用雑草名、使用目的および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数
果樹類	ハダニ類	300~400倍	200~700ℓ /10a	—	—	散布	—
なし	ニセナシサビダニ	300倍					
りんご	うどんこ病	350~450倍					
かんきつ	ミカンサビダニ	300~400倍					
かき	うどんこ病						
うめ	黒星病	400倍					
もも		300~500倍					
ぶどう	ブドウハモグリダニ	300倍		休眠期	—		—
いちご	うどんこ病	500~1000倍	100~300ℓ /10a	—	—		
野菜類							
麦類	さび病 うどんこ病 赤かび病	300~500倍	60~150ℓ /10a	—	—		
ばら	うどんこ病		100~300ℓ /10a				
きく	白さび病						
ホップ	べと病	250~500倍	200~700ℓ /10a	—	—		
芝	さび病	300~500倍	1ℓ/m ²				

使用上の注意事項

- 散布液調製の際には展着剤を加用し、調製後は速やかに使用してください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- マシン油乳剤との混用及びマシン油乳剤散布後14日以内の近接散布はさけてください。
- 気温が高くなるに従って葉害を生じやすくなるので、高温ほど散布液の濃度を所定の範囲内でうすくして使用してください。なお、夏期高温時(28℃以上)の散布はさけてください。
- うり類(きゅうり、まくわうり等)など硫黄剤に弱い作物への使用はさけてください。
- なしに使用する場合、春期以降で葉の退色・落葉・花卉焼けが生じるおそれがあるので、発芽前までに使用してください。
- ぶどうに使用する場合、葉害が生じるおそれがあるので、休眠期以外での使用はさけてください。
- 本剤は蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に葉害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 通常の使用方法では危険性は低いですが、誤飲、誤食などのないように注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際はマスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり、浴びたりしないように注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係ない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管に関する注意事項

- 火気をさけ、直射日光が当たらない低温で乾燥した場所に密封して保管してください。