

サンケイクムラス®

有効成分：硫黄・・・・・・・・・・79.2%

農林水産省登録 第21874号
 性状：褐色水和性微粒及び細粒
 毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
 消防法：第2類硫黄
 有効年限：5年
 包装：1kg×20、3kg×8

クムラス®はBASF社の登録商標です。

特長

- 使用回数制限がなく使いやすい薬剤です。
- 顆粒状製剤のため、薬液調製時の粉の舞い上がりがありません。
- 硫黄は古くからある剤です。予防剤で耐性菌は出にくいと言われています。

適用病害虫名、適用雑草名、使用目的および使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数
果樹類	ハダニ類	300～400倍	—	—	散布	—
いちご	うどんこ病	500～1000倍				
野菜類 豆類(種実) いも類	ハダニ類	400倍				
りんご	うどんこ病	350～450倍				
かんきつ	ミカンサビダニ	300～400倍				
かき	うどんこ病	400倍				
うめ	黒星病					
もも		300～500倍				
麦類	さび病 うどんこ病 赤かび病					
ばら	うどんこ病					
きく	白さび病					
ホップ	べと病	250～500倍				
芝	さび病	300～500倍				

使用上の注意事項

- 散布液調製の際には展着剤を加用し、調製後は速やかに使用してください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- マシン油乳剤との混用及びマシン油乳剤散布後14日以内の近接散布はさけてください。
- 気温が高くなるに従って薬害を生じやすくなるので、高温ほど散布液の濃度を所定の範囲内でうすくして使用してください。なお、夏期高温時(28℃以上)の散布はさけてください。
- 日本なし、ぶどう、うり類(きゅうり、まくわうり等)など硫黄剤に弱い作物への使用はさけてください。
- 本剤は蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 通常の使用方法では危険性は低いですが、誤飲、誤食などのないように注意してください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。
眼に入った場合には直ちに水洗し、医師の手当を受けてください。
- 散布の際はマスク、手袋、長スボン・長袖の作業衣などを着用してください。また散布液を吸い込んだり、浴びたりしないように注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくともこの散布当日)に小児や散布に関係ない人が、散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど、配慮してください。