



フェロモン剤（交信攪乱用）
アルミゲルア・ウワバルア・ダイアモルア・ビートアーミルア
・リトルア剤

コンフューザー[®]V

農林水産省登録 第23084号
(信越化学工業(株)登録)

性状：淡黄色澄明油状液体
毒性：普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指すという通称)
危険物：第四類第三石油類
有効年限：6ヶ月
包装：50本×80

有効成分：(Z)-9-ヘキサデセナル・・・1.0%
(Z)-11-ヘキサデセン-1-オール・・・0.50%
(Z)-7-ドデセニル=アセタート・・・5.9%
(Z)-7-ドデセン-1-オール・・・3.8%
(Z)-11-ヘキサデセナル・・・24.0%
(Z)-11-ヘキサデセニル=アセタート・・・19.2%
(Z,E)-9,12-テトラデカジエニル=アセタート・・・8.1%
(Z)-9-テトラデセン-1-オール・・・4.2%
(Z,E)-9,11-テトラデカジエニル=アセタート・・・19.5%

殺虫剤分類 **—**

コンフューザー[®]は信越化学工業(株)の登録商標です。

- 特長**
- 性フェロモンの特異的作用によって対象害虫の交尾を連続的に阻害し、害虫の発生を抑制することを目的としています(直接の殺虫作用はありません)。
 - 殺虫剤への感受性が低下した害虫にも有効です。
 - 天敵に対する影響は非常に少なく、人畜毒性もほとんどありません。
 - 本剤の有効成分は微生物等により容易に分解されるため、環境にやさしいです。
 - 殺虫剤の散布回数の削減が期待できます。
 - 作物への残留も心配なく、作業者に対しても安全です。

適用病害虫名及び使用方法

作物名	使用目的	適用病害虫名	10アール 当り 使用量	使用時期	使用方法
野菜類 いも類 豆類(種実) 花き類・ 観葉植物	交尾阻害	コナガ オオタバコガ ハスモンヨトウ タマナギンウワバ イラクサギンウワバ ヨトウガ	100~200本 (41g/100本製剤)	対象作物の栽培全期間	作物の生育に支障のない高さに支持棒等を立て支持棒にディスペンサーを巻き付け固定し圃場に配置する。
		シロイチモジヨトウ	100本 (41g/100本製剤)		

使用上の注意事項

- 本剤は、コナガ、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ、ヨトウガ、タマナギンウワバおよびイラクサギンウワバの各成虫の交尾を連続的に阻害し、交尾率を低下させることによる次世代の密度低下を目的としているので、これらの対象害虫の成虫発生初期から収穫期まで連続的に比較的広範囲な地帯で使用することをおすすめします。
- 対象害虫が高密度に存在する場合には状況に応じて天敵に影響の少ない殺虫剤を併用することをおすすめします。
- 本剤は支柱等に巻き付け、対象地帯に均一になるように設置することをおすすめします。
- 急傾斜地、風の強い地帯等本剤の濃度を維持するのが困難な地域では使用しないでください。
- 外装のアルミ箔袋を開封したまま放置すると有効成分が揮散するので、必ず使用直前に開封し、使いまわしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には、直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 危険物第四類第三石油類に属するので火気には十分注意してください。

保管に関する注意事項

- 密封し、火気をさけ、直射日光があたらない冷暗所(5℃以下)に保管してください。