

殺虫殺菌剤

エトフェンブロックス・バリダマイシン・フェリムゾン・フサライド粉剤

ブラシン®トレバリダ®粉剤DL

農林水産省登録 第18174号

(住友化学㈱登録)

性状：類白色粉末 45 μm以下 浮遊性指数 20以下

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指すという通称)

有効年限：5年

包装：3kg×8

有効成分：エトフェンブロックス・・・0.50%
バリダマイシンA・・・0.30%
フェリムゾン(PRTR・1種)・・・2.0%
フサライド(PRTR・1種)・・・1.5%

殺虫剤分類 **3A**
殺菌剤分類 **U18, U14, 16.1**

ブラシン®、トレバリダ®は住友化学㈱の登録商標です。

特長

- いもち病、紋枯病に対する優れた効果
いもち病、紋枯病に対して優れた治療効果と予防効果を兼ね備え、2大病害の同時防除を可能にします。
- 主要害虫に対する速効性
ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類に速効的に効果を発揮します。
- 稲の基幹防除剤として高品質米生産に貢献
いもち病、紋枯病、穂枯れ性病害およびウンカ類等との同時防除が可能であり、高品質米の生産に貢献します。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	エトフェンブロックスを 含む農薬の 総使用回数	バリダマイシンを 含む農薬の 総使用回数	フェリムゾンを 含む農薬の 総使用回数	フサライドを 含む農薬の 総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 変色米 (アルタナリア菌) 変色米 (カーブラリア菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌) 疑似紋枯症 (褐色菌核病菌) 疑似紋枯症 (褐色紋枯病菌) ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類	3~4kg	収穫14日 まで	2回以内	散布	3回以内	6回以内 (育苗箱灌注 は1回以内、 本田では5回 以内)	2回以内	3回以内
稲	カメムシ類	4kg							

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散布機の開度を一旦盛程度しぼって散布してください。
- たばこ、けいとう及びだいち、あずき、いんげんまめの幼植物には薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- きく(秀芳の力等)には薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。

安全使用上の注意事項

- 蚕に対して長期間毒性があるので近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 誤食などのないように注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(甲殻類、冷水魚)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。