

除草剤

ブタミホス粒剤

サンケイクレマート®U粒剤

農林水産省登録 第14654号

性状：灰白色細粒

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)

有効年限：3年

包装：3kg × 8

有効成分：ブタミホス (PRTR・1種)・・・3.0%

除草剤分類 **3**

クレマート®は住友化学㈱の登録商標です。

特長

- メヒシバ、スズメノカタビラ等のイネ科雑草だけでなく、アブラナ科、ナデシコ科等の多くの広葉雑草にも有効です。
- 本剤のガス作用は極めて少ないため、ハウス栽培、トンネル栽培やキャップ栽培等でも使用できます。
- 本剤は土壌吸着が強く、土壌移行性が小さいので、移植栽培に適しています。

適用雑草名および使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法	ブタミホスを含む 農薬の総使用回数
たまねぎ	一年生雑草	春播栽培の定植後 (雑草発生前) 但し収穫60日前まで	5～7kg	1回	全面土壌 散布	1回
		秋播栽培の 定植後又は春季の 雑草発生前 但し収穫60日前まで				
すいか 漬物用すいか メロン 漬物用メロン	一年生雑草	定植・マルチ前 (雑草発生前)	4～6kg	1回	畦間株間 土壌散布	1回
キャベツ		定植前～定植直後 (雑草発生前)				
トマト	一年生雑草	定植活着後 (雑草発生前) 但し定植10日後まで	5～6kg	1回	全面土壌 散布	1回
ねぎ わけぎ あさつき		植付後萌芽前 (雑草発生前)				
やまのいも さといも にんにく	一年生広葉 雑草	は種後発芽前 (雑草発生前)	4～6kg	1回	全面土壌 散布	1回
ばれいしょ らっかせい にんじん		植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し収穫120日前まで				
パセリ	一年生雑草	挿苗後(雑草発生前) 挿苗3日後まで	4～6kg	1回	畦間株間 土壌散布	1回
こんにゃく		定植後(雑草発生前) 但し定植10日後まで				
かんしょ	一年生雑草	定植前(雑草発生前)	5kg	1回	全面土壌 散布	1回
にら		定植後(雑草発生前) 但し定植10日後まで				
きゅうり	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草発生前)	3～5kg	1回	全面土壌 散布	1回
くわい		親株養成期 (雑草発生前)				
せり	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草発生前)	4kg	1回	全面土壌 散布	1回
やまのいも (むかご)		親株養成期 (雑草発生前)				

作物名	適用雑草名	使用時期	10 アール 当り使用量	本剤の 使用回数	使用方法	ブタミホスを含む 農薬の 総使用回数
きく	一年生雑草	定植後（雑草発生前）	4～6kg	1回	全面土壤 散布	1回
つつじ類 さざんか		植付後又は生育期 （雑草発生前）		3回 以内		3回以内
桑		春季桑発芽前および 夏季収穫後発芽前 （雑草発生前）	8～10kg	2回 以内		2回以内
たばこ （折衷マルチ栽培）		植付 10 日前まで （雑草発生前）	4kg	1回		1回

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は雑草発生前処理の効果は大きいですが既発生の雑草には効果が劣るので、必ず雑草発生前に全面に均一に散布してください。
- 多年生雑草およびキク科雑草およびツクサには効果が劣るので、それらが優占する圃場での使用はさけてください。
- 土壤が極度に乾燥している場合は効果が劣るので土壤が適度の水分を含んでいる時に使用してください。
- こんにやく、らっかせい、かんしょ等に使用する場合は、とくに碎土、整地、覆土は、ていねいに行って均一に散布してください。
- 作物の生育中に散布する際は、できるだけ薬剤が作物にかからないように注意してください。
- 桑に使用する場合、桑葉にかかることと葉害を生じるので、給桑葉のない春季又は夏季収穫後の桑の発芽前に散布してください。
- たばこに使用する場合、葉害を生じることがあるので、植付時に処理土壤が莖葉に付着しないように注意してください。またトンネル栽培および改良畦面栽培では使用しないでください。
- キャベツの定植直後に使用する場合は、次の注意を守ってください。
 - 降雨または朝露等により葉面が濡れている状態では使用しないでください。
 - 極端な深植えでは使用しないでください。
- くわい、せりに使用する場合、砂質土の水田や漏水田（減水深2cm /日以上）への使用はさけてください。また、散布後少なくとも7日間はそのまま湛水状態を保ち、落水、かけ流しはしないでください。
- 散布の際、付近の他の作物にかからないように注意してください。
- 本剤の使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

安全使用上の注意事項

- 誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤による中毒の治療法としては動物実験で硫酸アトロピン製剤及びPAM 製剤の併用投与が有効であると報告されています。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は身体を石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物（甲殻類、藻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管に関する注意事項

- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。